



ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

Βοριούχο λίπασμα σε διάλυμα (βοριούχος αιθανολαμίνη)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (w/w)

Υδατοδιαλυτό Βόριο (B).....2%

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0°C.
- Διατηρήστε το προϊόν ερμητικά κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που παρέχονται, προέρχονται από εκτεταμένες και αυστηρές μελέτες και δοκιμές. Ωστόσο, αρκετοί εξωγενείς παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την χρήση του προϊόντος (προετοιμασία ψεκαστικού διαλύματος, τρόπος εφαρμογής, καιρικές συνθήκες κλπ). Ο κατασκευαστής εγγυάται την σύνθεση, την μορφή και το περιεχόμενο. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές(απώλεια αποτελεσματικότητας, τοξικότητα, υπολείμματα κλπ) που θα προκληθούν από μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας.

Πιθανή αλλαγή στο χρώμα δεν επηρεάζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Garex B



ΠΑΡΤΙΔΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:



διαφυλλική
εφαρμογή



Alter
nativ®
0,0
δεν αφήνει
υπολείμματα



βιολογικό

1L 5L 20L

Altinco^{agro}

GarexB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GarexB** είναι ένα διάλυμα βοριούχου λιπάσματος με βοριούχο αιθανολαμίνη που προλαμβάνει και διορθώνει τις συνέπειες που δημιουργούνται από την έλλειψη Βορίου στις καλλιέργειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαφυλλική Εφαρμογή:

- Όπωροκηπευτικά: 100 cc/100L ψεκ. διαλύματος(1L/ha)
- Όπωροφόρα δέντρα: 150-200 cc/100L ψεκ. διαλύματος(1.5-2 L/ha)

Οι διαφυλλικές εφαρμογές πρέπει να γίνονται με τη χρήση κατάλληλα βαθμονομημένων ψεκαστών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής όγκος ψεκαστικού υγρού, με βάση το μέγεθος και την πυκνότητα της καλλιέργειας, ο οποίος να επιτρέπει την καλή κάλυψη τόσο των νέων όσο και των παλαιών φύλλων, χωρίς την απορροφή ή τη συγκέντρωση του ψεκαστικού διαλύματος στα περιθώρια των φύλλων, τα φρούτα, ή άλλους φυτικούς ιστούς. Η καλή κάλυψη θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και βέλτιστη χρήση αυτού του προϊόντος. Εξασφαλίστε μια καλή κάλυψη της άνω και κάτω πλευράς του φυλλώματος και αποφύγετε τη δημιουργία απορρέοντος διαλύματος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες ζημιές σε νέους ιστούς.

Το **GarexB** μπορεί να αναμιχθεί με διαβρεκτικούς παράγοντες και συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 15°C και 30°C.

Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά όπου έχει επισημανθεί πρόβλημα κάθε 10-14 ημέρες.



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Εκ) Νο. 834/2007 & 889/2008.

Επιθεωρήθηκε από την Ecocert SA F-32600.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ:
ΚΥΤΤΑΡΟ Α.Ε.

4ο ΧΛΜ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 2373091842

www.kyttarogro.gr



ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Altinco, SL**

Pol. Ind. Pla d'Urgell, Nau 12 · Camí d'Arbeca s/n
25230 Mollerussa - Lleida (Ισπανία)

T. +34 973 712 113 · F. +34 973 712 444

www.altinco.com